Recept

Recept · 1 maaltijd · 50 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

196 kcal per maaltijd · 392 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 8 en% · koolhydraten 86 en% (waarvan suikers 15) · vet 3 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 3 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Kellogg's Special K Original, ontbijtproduct, klaar voor consumptie	50 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	830	1660			10%
kcal (kcal)	196	392			10%
Eiwit (g)	4	8	8,2		7%
Koolhydraten (g)	42	84	85,7		16%
Suiker (g)	7,5	15	15,3		15%
Water (g)	0,35	0,7			0%
Vet (g)	0,65	1,3	3,0		1%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	3	6	3,1		10%
Verzadigd (g)	0,15	0,3	0,7		1%
EOV (g)	0,2	0,4			0%
MOV (g)	0,25	0,5			1%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0,25	0,5			3%
Omega 3 ALA (g)	0	0			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,9	1,8		82%
B2 (mg)	1,2	2,3		72%
B3 (mg)	8	16		47%
B6 (mg)	0,7	1,4		47%
B12 (µg)	1,3	2,5		45%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	4,2	8,4		42%
E (mg)	–	–		–
K (µg)	0,1	0,2		0%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	277	554		92%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	30	60		3%
Fosfor (mg)	85	170		15%
Magnesium (mg)	20	40		6%
Koper (mg)	–	–		–
Jodium (µg)	1,2	2,4		1%

IJzer (mg)	7	14	64%
Selenium (µg)	–	–	–
Zink (mg)	0,75	1,5	8%
Kalium (mg)	110	220	3%
Natrium (mg)	168	336	11%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	0,1	0,2		
Eiwit plantaardig (g)	4	8		7%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	34,5	69		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,6	1,2		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	7	14		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl