Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

28 kcal per maaltijd · 14 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 43 en% · koolhydraten 29 en% (waarvan suikers 8) · vet 13 en% (waarvan verzadigd 2) · vezel 21 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Nieuw-Zeelandse spinazie, rauw	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	118	59			1%
kcal (kcal)	28	14			1%
Eiwit (g)	3	1,5	42,9		5%
Koolhydraten (g)	2	1	28,6		1%
Suiker (g)	0,58	0,29	8,3		1%
Water (g)	188	94			13%
Vet (g)	0,4	0,2	12,9		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	3	1,5	21,4		10%
Verzadigd (g)	0,06	0,03	2,1		0%
EOV (g)	0,01	0,01			0%
MOV (g)	0,17	0,08			1%
Omega 3 (g)	0,13	0,07			10%
Omega 6 (g)	0,03	0,01			0%
Omega 3 ALA (g)	0,13	0,07			12%
Omega 3 EPA+DHA (g)	–	–			–

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,08	0,04		7%
B2 (mg)	0,26	0,13		16%
B3 (mg)	–	–		–
B6 (mg)	0,61	0,3		41%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	60	30		80%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	2,8	1,4		22%
K (µg)	674	337		963%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	30	15		10%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	116	58		12%
Fosfor (mg)	56	28		10%
Magnesium (mg)	78	39		22%
Koper (mg)	0,19	0,09		21%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	1,6	0,8	15%
Selenium (µg)	1,4	0,7	2%
Zink (mg)	0,76	0,38	8%
Kalium (mg)	260	130	7%
Natrium (mg)	260	130	17%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	–	–		–
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	674	337		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	–	–		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	–	–		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	–	–		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	–	–		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	2,8	1,4		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl