Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

136 kcal per maaltijd · 68 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 8 en% · koolhydraten 51 en% (waarvan suikers 38) · vet 40 en% (waarvan verzadigd 16) · vezel 2 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Nutrilon opvolgmelk, 2, per 100 ml, in blik of glas	200 ml

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	572	286			7%
kcal (kcal)	136	68			7%
Eiwit (g)	2,8	1,4	8,2		5%
Koolhydraten (g)	17,2	8,6	50,6		7%
Suiker (g)	13	6,5	38,2		26%
Water (g)	173	86,4			12%
Vet (g)	6	3	39,7		7%
Cholesterol (mg)	–	–			–
Vezels (g)	1,2	0,6	1,8		4%
Verzadigd (g)	2,4	1,2	15,9		11%
EOV (g)	2,2	1,1			2%
MOV (g)	1	0,5			4%
Omega 3 (g)	–	–			–
Omega 6 (g)	–	–			–
Omega 3 ALA (g)	0,14	0,07			13%
Omega 3 EPA+DHA (g)	–	–			–

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,1	0,05		9%
B2 (mg)	0,24	0,12		15%
B3 (mg)	0,8	0,4		5%
B6 (mg)	0,08	0,04		5%
B12 (µg)	0,36	0,18		13%
C (mg)	20	10		27%
D (µg)	2,8	1,4		28%
E (mg)	2,4	1,2		18%
K (µg)	10	5		14%
A (µg)	132	66		
B11 / Foliumzuur (µg)	54,4	27,2		18%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	130	65		13%
Fosfor (mg)	72	36		13%
Magnesium (mg)	10	5		3%
Koper (mg)	0,08	0,04		9%
Jodium (µg)	26	13		17%

IJzer (mg)	2	1	18%
Selenium (µg)	4	2	6%
Zink (mg)	1	0,51	11%
Kalium (mg)	148	74	4%
Natrium (mg)	46	23	3%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	132	66		17%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	10	5		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	2,8	1,4		5%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	4,2	2,1		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	5,8	2,9		
Transvetten (g)	–	–		
EPA (g)	–	–		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0,02	0,01		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	2	1		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	132	66		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl