Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

44 kcal per maaltijd · 22 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 35 en% · koolhydraten 36 en% (waarvan suikers 13) · vet 4 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 25 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Snijbonen, rauw	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	186	93			2%
kcal (kcal)	44	22			2%
Eiwit (g)	3,8	1,9	34,5		7%
Koolhydraten (g)	4	2	36,4		2%
Suiker (g)	1,4	0,7	12,7		3%
Water (g)	185	92,7			12%
Vet (g)	0,2	0,1	4,1		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	5,4	2,7	24,5		18%
Verzadigd (g)	0	0	0,0		0%
EOV (g)	0	0			0%
MOV (g)	0	0			0%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0	0			0%
Omega 3 ALA (g)	0,04	0,02			4%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,14	0,07		13%
B2 (mg)	0,12	0,06		8%
B3 (mg)	1,2	0,6		7%
B6 (mg)	0,1	0,05		7%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	10	5		13%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,4	0,2		3%
K (µg)	52	26		74%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	44	22		15%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	80	40		8%
Fosfor (mg)	60	30		11%
Magnesium (mg)	20	10		6%
Koper (mg)	0,04	0,02		4%
Jodium (µg)	4	2		3%

IJzer (mg)	1	0,5	9%
Selenium (µg)	2	1	3%
Zink (mg)	0,8	0,4	9%
Kalium (mg)	500	250	14%
Natrium (mg)	8	4	1%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	60	30		2%
Alfa-caroteen (µg)	236	118		34%
Luteine (µg)	526	263		26%
Zeaxanthine (µg)	0	0		0%
Lycopeen (µg)	76	38		2%
RAE (µg)	14	7		2%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	52	26		
Eiwit plantaardig (g)	3,8	1,9		7%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	0,6	0,3		
Polysacchariden (g)	2,6	1,3		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,2	0,1		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	1	0,5		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	30	15		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl